n°. 15.

Observation sur une tumeur du scrotum, suitte d'une contusion interne.

Le nommé St jean, Cavalier au regiment des Cravattes, Compagnie des chevaux legers, étant a cheval, éprouva tout à coup une douleur très vive le long des cordons spermatiques droits, laquelle s'étendoit jusqu'à l'aine; il y porta d'abord la main et y trouva une enflure considérable. La douleur s'appaisa peu a peu et quoique la tumeur fut à peu près la même, il remonta a cheval le surlendemain; aussitôt les mouvemens rappellerent les douleurs et l'engorgement augmenta.

L'elève de Monsr. D. chirurgien major du Corps qui luy fit la premiere visitte, assura l'existence d'un entero-épiplocèle, ce qui fut confirmé par Monsr. Del. après avoir palpé la tumeur et pris les informations ordinaires, ce qui le décida a le faire entrer à L'hopital.

L'inspection seule de la tumeur ne presentoit rien moins qu'une hernie, elle étoit exactement ronde, également tendue et molle jusqu'à un travers de doigt audessous de l'anneau, qui étoit dans un état naturel. Le corps du testicule placé à la partie déclive de cette tumeur indolente, étoit beaucoup plus volumineux que l'autre et dur. le malade avoit le ventre libre et n'éprouvoit aucun accident qui put faire soupçonner la gêne des parties que l'on assuroit être compromises dans la tumeur et que l'on avoit, disoit on, aisément distingué lors de sa naissance et que l'on supposoit former étranglement.

Aux anodins relachans que l'on avoit d'abord employé je fis substituer les résolutifs aromatiques. je fis placer quelques légères saignées, le pouls étant dans une disposition presque naturelle. Les lavemens, un régime fort exact et une boisson vulnéraire, furent les soins que je crûs devoir

ARC 18 d. 2 n°. 15 LOMBARD

d'abord donner à la maladie. Le volume de la tumeur loin de diminuer —
parut même augmenter. on en imputa la cause aux topiques résolutifs que
l'on se força de remplacer, malgrés bonnes raisons, par des emmolliens et le
Cataplâme de micâ panis; topiques sous les quels, elle n'augmenta pas —
moins.
en envisageant cette maladie comme une Contusion du testicule et des —
vaisseaux spermatiques et en comparant la marche de la tumeur à celle
d'un genre différent, je pensai qu'elle étoit du caractère d'un hématocèle, ou
d'un hydrocèle qui deviendroit plus considérable encore, si l'on soumettoit
l'usage des emmolliens. L'évènement justiffia ce que j'avois avancés, cinq
jours après mon jugement, nous fumes d'accord qu'on y plongeroit le —
trois-quart, vû la tension molle et la fluctuation apparente. nous en
tirâmes en effet deux palettes environ d'une eau très limpide et sans odeur,
La tumeur s'affaissa sous cette opération et nous crûmes qu'il seroit —
prudent d'y passer un Séton de fil de Soye crue. cette manoeuvre
n'eut pas à beaucoup près le succès que nous en attendions. le —
Lendemain la tumeur s'éleva de nouveau avec des douleurs extrêmement
vives et son volume fut si considérrble que sans exagération elle —
égala dans peu, la tête d'un enfant nouveau né. le Cordon paroissoit
Singulièrement engorgé et s'étendait à plus de quatre travers de doigt
dans le bas ventre. tout ce qui étoit Compromis, étoit dur, enflammé
douloureux et lancinant. je Suprimai d'abord le Séton, je recourrût aux
Saignées, au régime, aux lavemens, et aux anodins émmolliens, animés
d'un peu de Camphre. le Changement Subit et violent ne laissoit —
plus entrevoir qu'une gangrène, tant les Simptômes étoient éffrayans.
ou tout au moins une Suppuration très proffonde. L'amoindrissement
de la tumeur, sa Sensibilité presqu'éteinte, sa molesse &c. présagèrent
bien-tôt l'existence d'un fluide, au quel on donna issüe par —
L'organe du trois-Carre. il en sortit environ deux cuillerées d'un pus

Saiable. j'ouvris la tumeur sur la crenchure d'une sonde que j'engageai par l'ouverture de la canule qui n'étoit point crénelée. je découvris un foyer très considérable qui étoit fixé dans la tunique vaginale (et qui vray-semblablement ~~étoit~~ avoit été celuy de l'hydrocelle) le quel s'etendoit depuis l'anneau jusque sur le testicule dont une portion étoit suppuré et duquel il s'est détaché quelques parcelles. je vis alors que la tension et l'élévation du trajet des cordons, ne dépendoient que de l'épaississement des tuniques.

un pansement fait avec de petits plumaceaux imbus d'huile de therébentine et que l'on appliquoit par gradation, après les avoir pressé entre deux linges, un plus grand imbu de beaume du pérou liquide et recouvert d'un digestif stimulant, des frictions à doses menagées, faittes avec l'onguent double, sur les duretés voisines, un emplâtre avec partie egale de diachilon gommé et de Dirigo. c. m. pour couvrir le tout, enfin quelques légers purgatifs et un régime convenable et proportionné, ont rendu le testicule à son état presque naturel quant au volume, si ce n'est qu'il est encore dur dans sa partie inferieure, la playe touchant presqu'à sa fin.)

Lombard Correspondant de l'académie Royale de chirurgie et chirurgien major des Hopitaux a Dole en Comté Le 9 decembre 1776